



Minister Zdrowia

Warszawa, 15 września 2022

ZPŚ.641.279.2022.JK

**Komunikat nr 28 Ministra Zdrowia
w sprawie realizacji szczepień przypominających przeciw COVID-19
w Narodowym Programie Szczepień.**

Minister Zdrowia informuje, że od dnia 16 września 2022 r. w punktach szczepień będą dostępne szczepionki mRNA o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron¹ stosowane wyłącznie w realizacji szczepień przypominających.

Szczepienia drugą dawką przypominającą będą wykonywane szczepionką o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron.

Możliwość stosowania szczepionek o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron w przypadku podania pierwszej dawki przypominającej jest uzależniona od dostępności do szczepionki w punkcie szczepień.

Zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. COVID z dnia 9.09.2022 r. oraz ze stanowiskiem Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 14.09.2022 r. opartym na wspólnym stanowisku z dnia 6 września 2022 r. Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), na temat szczepień przypominających szczepionkami zaktualizowanymi dla wariantu Omikron, szczepionki te mogą być stosowane jako dawki przypominające u osób które ukończyły 12 r.ż. z zachowaniem **co najmniej 3 miesięcznego odstępu** od szczepienia podstawowego lub podania dawki przypominającej.

¹ - zaktualizowane szczepionki zostały zaadaptowane w celu lepszego dopasowania do krążących wariantów SARS-CoV-2. Zawierają mRNA kodujące białko S wariantu oryginalnego wirusa SARS-CoV-2 oraz podwariantów Omikron. Mogą zwiększyć ochronę przed nowymi wariantami i dlatego są ważnym narzędziem kontroli pandemii w miarę ewolucji wirusa.

Uwaga! Szczepienia drugą dawką przypominającą zaleca się dla wszystkich osób, które ukończyły 12 r.ż. i otrzymały co najmniej przed trzema miesiącami pierwszą dawkę przypominającą.

UWAGA! Ulega skróceniu z 4 miesięcy do 3 miesięcy dotychczas wymagany minimalny odstęp podania drugiej dawki przypominającej od pierwszej dawki przypominającej.

Informacje dodatkowe:

- priorytetowo szczepieniami przypominającymi powinny być objęte osoby: które ukończyły 60 lat, ukończyły 12 lat z zaburzeniami odporności, ukończyły 12 lat z chorobami przewlekłymi obarczonych ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 lub pogorszeniem choroby przewlekłej; personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z pacjentami lub materiałem zakaźnym lub narażonego na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
- w przypadku dostępności różnych preparatów mRNA, jako dawka przypominająca powinna być wybrana szczepionka o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron,
- w sytuacji, jeżeli zaktualizowany preparat do szczepień przypominających jest niedostępny należy użyć szczepionkę oryginalną Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) w połowie dawki, wybierając preferencyjnie preparat, którym zrealizowano szczepienie podstawowe lub pierwszą dawkę przypominającą,
- w pierwszym szczepieniu przypominającym mogą być wykorzystywane szczepionki zaktualizowane z wariantem Omikron*, jak i szczepionki oryginalne mRNA, Nuvaxovid i Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Cilag International NV) **.

(*w przypadku dostępności do szczepionki w punkcie szczepień do szczepień pierwszą dawką przypominającą, **zalecane podanie w przypadku konieczności kontynuacji szczepienia ze względu na indywidualne wskazania pacjenta)

- szczepienie dawką przypominającą ozdowieńców należy realizować w odstępie co najmniej 3 miesięcy od infekcji SARS-CoV-2,
- jeżeli to możliwe, dawki szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zarówno szczepienia podstawowego jak i dawki przypominającej) należy podać co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę,

- osoby w stanie immunosupresji, również te, które otrzymały łącznie 5 dawek szczepionki mRNA przeciwko COVID-19, należy poinformować o ryzyku słabszej odpowiedzi immunologicznej na szczepienie, a tym samym konieczności dalszego przestrzegania obowiązujących zasad ochrony przed COVID-19. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony pacjentom w stanie immunosupresji, szczepienie przeciw COVID-19 należy rekomendować osobom z ich bliskiego otoczenia (strategia kokonowa),
- nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie,
- na etapie wprowadzania danych do karty szczepień należy bezwzględnie przestrzegać zachowania procedury dla skierowań wystawionych dla dawki przypominającej,
- przed podaniem kolejnej dawki szczepionki należy bezwzględnie potwierdzić aktualny stan zaszczepienia pacjenta,
- niezależnie od preparatu, który użyto do pierwszego szczepienia przypominającego, należy podać kolejną dawkę szczepionki mRNA co najmniej 3 miesiące od ostatniego szczepienia,
- skierowanie na szczepienia przypominające są wystawiane z zachowaniem odstępu (minimum 90 dni) automatycznie przez system,
- **w przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania na szczepienie przypominające lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym do szczepienia oceniając odstęp od ostatniego szczepienia (minimum 90 dni) oraz wiek pacjenta.**

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

DRUGA DAWKA PRZYPOMINAJĄCA (2/przypominająca)				
Ukończony cykl szczepienia – wykonanie szczepienia przypominającego (P)	Dopuszczone preparaty	Preferowany preparat	odstęp w dniach	nazwa dawki/numer podawanej dawki
Pfizer (1/P)	Pfizer*, Pfizer, Moderna 1/2, Moderna*	Pfizer*	90	2/przypominająca
Moderna (1/P)	Moderna 1/2 dawki, Moderna*, Pfizer, Pfizer*	Moderna*	90	2/przypominająca
Novavax (1/P)	Pfizer*, Pfizer, Moderna 1/2, Moderna*	Pfizer*, Moderna*	90	2/przypominająca
JJ (1/P)	Pfizer, Pfizer*, Moderna 1/2, Moderna*	Pfizer*, Moderna*	90	2/przypominająca

* szczepionki z wariantem Omicron

PIERWSZA DAWKA PRZYPOMINAJĄCA				
Ukończony cykl szczepienia	Dopuszczone preparaty	Preferowany preparat	odstęp w dniach	nazwa dawki
Novavax (2/2)	Novavax, Pfizer, Pfizer*, Moderna 1/2, Moderna*, JJ	Novavax	90	Przypominająca
Pfizer (2/2)	Pfizer, Pfizer*, Moderna 1/2, Moderna*, JJ, Novavax	Pfizer*	90	Przypominająca
Moderna (2/2)	Moderna 1/2 dawki, Moderna*, Pfizer, Pfizer*, JJ, Novavax	Moderna*	90	Przypominająca
AZ (2/2)	Pfizer, Pfizer*, Moderna 1/2 dawki, Moderna*, Novavax	Pfizer*, Moderna*, Novavax	90	Przypominająca