

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

Przygotowanie do kolonoskopii – preparat **EZICLEN**

Następnym lekiem dostępnym w aptekach jest **EZICLEN**. Otwieramy jedną butelkę, wlewamy do dołączonego kubka i uzupełniamy wodą do kreski zaznaczonej na kubku. Lek spokojnie wypijamy w przeciągu 30 – 60 minut. Następnie w ciągu godziny dopijamy jeszcze czystą wodę niegazowaną. Po 4 godzinach przyjmujemy drugą porcję w ten sam sposób co poprzednią.

Planowane badanie kolonoskopowe w godzinach przedpołudniowych (do godziny 12.00):

- w dniu poprzedzającym badanie wypić w godzinach wieczornych 0,5 litra wody z rozpuszczoną 1 butelką leku Eziclen a następnie wypić 1 litr napoju niegazowanego i klarownego,
- w dniu badania w godzinach rannych wypić kolejne 0,5 litra wody z rozpuszczoną 1 butelką leku Eziclen, możliwie jak najkrócej przed badaniem (około 2 godzin), a następnie wypić 1 litr napoju niegazowanego i klarownego.

Planowane badanie kolonoskopowe w godzinach popołudniowych (po godziny 12.00):

- w dniu badania wypić 0,5 litra wody z rozpuszczoną 1 butelką leku Eziclen we wczesnych godzinach porannych (około godziny 7-8 rano) i kolejne 0,5 litra wody z rozpuszczoną 1 butelką leku Eziclen możliwie najkrócej przed badaniem (około 2 godzin).

Dodatkowe zalecenia

Kilka dni przed badaniem:

- nie spożywać tłustych wędlin, mięs; sałatek, warzyw i owoców pestkowych; pestek (siemię lniane, mak, itp.); ciemnego pieczywa; napojów gazowanych,
- dieta półpłynna, kisiele, kleiki, ryż, makaron, chleb, gotowane mięso i ryby, napoje niegazowane, klarowne, herbata, kawa (bez fusów).

W dniu badania:

- nie spożywać pokarmów. Do 2 godzin przed badaniem można pić płyny niegazowane i klarowne (herbata, kawa bez mleka). Można ssać landrynki. Leki nasercowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwpadaczkowe przyjmować normalnie zgodnie z zaleceniami lekarskimi.