

## PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

### **Przygotowanie do kolonoskopii – preparat **MOVIPREP****

W przypadku przygotowania MOVIPREPEM, również przestrzegamy diety lekkiej przez 5 dni przed badaniem. Przez 3 dni nie spożywamy produktów zawierających pestki. Moviprep składa się z dwóch saszetek A i B. Saszetkę A+B należy rozpuścić w litrze wody, wypić w ciągu godziny, a następnie wypić jeszcze w ciągu następnej godziny 1.5l wody niegazowanej. Drugą porcję po 4h od pierwszej dawki, przygotowując w ten sam sposób. W przypadku przygotowania Moviprepem, również przestrzegamy 5 dni przed badaniem specjalnej diety lekkiej. 3 dni przed wykluczamy produkty zawierające pestki. Lek składa się także z dwóch porcji – pierwszą porcję/saszetkę A+B rozpuszczamy w litrze wody, spokojnie wypijamy w ciągu godziny, a w ciągu następnej godziny dopijamy jeszcze 1.5l wody niegazowanej. Tak samo postępujemy z drugą porcją – po 4h od pierwszej dawki.

### **Planowane badanie kolonoskopowe w godzinach przedpołudniowych (do godziny 15.00):**

- w dniu poprzedzającym badanie ostatnim posiłkiem jest lekkie śniadanie,
- roztwór pierwszej torebki Moviprep (saszetki A i B rozpuścić w 1 litrze wody mineralnej niegazowanej) wypić małymi porcjami w godzinach wieczornych w dniu poprzedzającym badanie, a następnie do rana następnego dnia należy dopić 1 litr zwykłego płynu – najlepiej wody,
- w dniu badania roztwór drugiej torebki Moviprep (saszetki A i B rozpuścić w 1 litrze wody mineralnej niegazowanej) wypić w godzinach porannych możliwie jak najkrócej przed badaniem.

### **Planowane badanie kolonoskopowe w godzinach popołudniowych (po godziny 15.00):**

- w dniu poprzedzającym badanie można zjeść lekki posiłek do godz. 13
- roztwór pierwszej torebki Moviprep (saszetki A i B rozpuścić w 1 litrze wody mineralnej niegazowanej) wypić małymi porcjami,
- w dniu badania w godzinach porannych (około godziny 7-8 rano) i kolejnej torebki (saszetki A i B rozpuścić w 1 litrze wody mineralnej niegazowanej ) na 2-3 godziny przed badaniem.

### **Dodatkowe zalecenia**

- wskazana dieta bezpestkowa na 3 dni przed badaniem,
- na badanie zgłosić się z osobą towarzyszącą na wyznaczoną godzinę,
- pacjent nie może prowadzić samochodu jeżeli zabieg będzie wykonywany w znieczuleniu.